Étude d'Interaction protéine-ligand en spectrométrie de masse (MS)

Principe

- m/z d'un ion en phase gazeuse

La MS supramoléculaire ou native
(Conditions non dénaturantes)

- Stœchiométrie
- Spécificité
- Sélectivité
- Affinité

Appareillage

- 3 étapes essentielles:
 - Ionisation de l'échantillon
 - Analyse des ions formés
 - Détection du signal

Le MALDI

La source d'ionisation par Electronébulisation (*Electrospray*) (ESI)

Miniaturisation de la source electrospray: le nanospray

L'analyseur, le détecteur

Application de la spectrométrie de Masse: L'étude d'interactions non covalentes

Paramètres:

- conditions non dénaturantes (en solution)=Electrospray
- Tampon Ph 7= acétate d'ammonium
- Réduire la pression à l'interface du nébuliseur et analyseur
- Réduire la tension d'accélération des ions à l'interface
- Utiliser un analyseur « doux » (TOF)

Application de L'ESI-MS :Etude de constantes d'équilibres de complexes non-covalents.

1ere étape: spectre de l'insuline(5800 DA)
seule

- Plusieurs pics correspondant à l'insuline plus ou moins multi protonée

Figure 1. ESI-MS spectrum of 1.0×10^{-6} M insulin in positive ion mode at pH 7 (Mean values of target mass with m/z at 1000 and target m/z at 1500).

Application de L'ESI-MS : Etude de constantes d'équilibres de complexes non-covalents.

Figure 4. ESI mass spectra at different mole ratios of Ca(II)-insulin to insulin at pH 7: (a)

Ca(II)/Insulin: 100/1 and (b) Ca(II)/Insulin: 400/1.

Figure 6. ESI mass spectra at different mole ratios of Mg(II)-insulin to insulin at pH 7: (a)

Mg(II)/Insulin: 100/1 and (b) Mg(II)/Insulin: 400/1.

↗ [ions ajoutés]

↘ Abondance
insuline libre

2^{ème} étape: spectre de l'insuline en présence de concentration croissante d'ions Ca²⁺ ou Mg²⁺

Application de L'ESI-MS :Etude de constantes d'équilibres de complexes non-covalents.

Figure 5. Calculation of the equilibrium constants of Ca(II)-insulin complexes.

Figure 7. Calculation of the equilibrium constants of Mg(II)-insulin complexes.

$$a = 1/K_1K_2$$

$$b = 1/K_1$$

Table 1. Equilibrium constants of Ca(II)-insulin complexes	
Equilibrium reactions	Equilibrium constants
$\text{Ca(II)-insulin} = \text{Ca(II)} + \text{Insulin}$	$K_1: 1.29 \times 10^{-4} \text{ M}$
$\text{Ca(II)}_2\text{-insulin} = \text{Ca(II)} + \text{Ca(II)-insulin}$	$K_2: 9.69 \times 10^{-4} \text{ M}$

Table 2. Equilibrium constants of Mg(II)-insulin complexes	
Equilibrium reactions	Equilibrium constants
$\text{Mg(II)-insulin} = \text{Mg(II)} + \text{Insulin}$	$K_1: 1.37 \times 10^{-4} \text{ M}$
$\text{Mg(II)}_2\text{-insulin} = \text{Mg(II)} + \text{Mg(II)-insulin}$	$K_2: 9.12 \times 10^{-4} \text{ M}$

Complémentarité avec d'autres techniques d'analyse

- Techniques spectroscopiques (FRET)

- Sensible mais artéfacts possibles
- In vivo

Conclusion sur les Avantages et inconvénients/Limitations de la MS

- Faibles quantités requises
- Étude des ligands sans avoir à les étiqueter/marquer
- Mesure de masse précise
- Sensible, détection rapide
- Limites de l'étude par MS de systèmes à faible affinité

Merci de votre attention